

☆ 予 防 接 種 ☆

それぞれの予防接種を実施する推奨時期は、お母さんから赤ちゃんにあげていた免疫効果の減少、感染症にかかりやすい年齢、かかった場合に重症化しやすい年齢などを考慮して設定されています。感染症からお子さんを守るために予防接種の効果と副反応をよく理解し、接種間隔を守って接種しましょう。

【予防接種の受け方】 予防接種のスケジュールはかかりつけ医に相談しましょう！ 予防接種は体調が良いときに受けるのが原則です！

① 電話予約

予防接種の案内(予診票)が届いたら、接種年齢（月齢）を確認してから契約医療機関へ電話予約します。



② 医療機関受診

接種当日の体調がいい場合は、予診票を記入して母子健康手帳を持参して行きましょう。

※接種当日の体調が悪い場合は、医療機関へ電話して予約を変更してください。

※必要な場合は、複数のワクチンを同時に接種することが可能です。かかりつけ医と相談しましょう



病気との間隔

突発性発疹、手足口病、伝染性紅斑、「かぜ」といわれるウイルス性疾患などでは
治療後1～2週間以上あける

風しん、水痘、おたふくかぜ、抗菌剤を必要とした細菌感染症では、治療後2～4週間以上あける

麻しん
治療後4週間以上あける



【予防接種スケジュール】

ワクチン名	0歳	1か月	2か月	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月	1歳	1歳6か月	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳	11歳	12歳	13歳	14歳	15歳
不：B型肝炎			①②										③															
生：ロタウイルス 1価			①②																									
生：ロタウイルス 5価			①②③																									
不：小児用肺炎球菌			①②③											④														
不：5種混合(DPT-IPV・Hib)			①②③											④														
生：BCG					①																							
生：MR(麻しん風しん混合)													①							②								
生：水痘(水ぼうそう)													①															
生：おたふくかぜ(任意接種)													①															
不：日本脳炎																												
不：HPV(2価・4価・9価) 子宮頸がん予防ワクチン																												

※0歳のうちに3回接種が必要です。

ロタウイルスワクチンは、遅くとも生後14週6日までに接種を開始し、ワクチンに応じた必要回数を受けます。

2期(DT)
※6年生の4月にご案内します

※小学校入学前の1年間

本郡町では標準的な接種期間となる3歳になる月に予診票をお送りします。

中学1年生の女子へ案内しています。9価ワクチンの場合、初回接種が15歳未満なら2回又は、3回接種。15歳以上なら3回接種。


定期予防接種の対象年齢(無料)

おすすめ接種時期(数字は接種回数)

予防接種の接種間隔

注射生ワクチン

麻しん、風しん、麻しん風しん混合(MR)、BCG、おたふくかぜ、みずぼうそう の予防接種を受けた方は…



27日以上の間隔をあけて

他の注射生ワクチン

麻しん、風しん、麻しん風しん混合(MR)、BCG、おたふくかぜ、みずぼうそう の予防接種

本郡町 予防接種情報 ホームページ



予防接種スケジュール

